


**ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
(Από τον Απολογισμό του 2015)**

1. Σύνολο κλήσεων (Σχ. 1).

Το 2015 καταγράφηκαν 31.018 περιπτώσεις που αναφέρονται κυρίως σε δηλητηριάσεις. Οι 27.963 αφορούσαν σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων και οι 3.055 σε ερωτήματα για δηλητηριάσεις ή για άλλα θέματα ιατρικής. Ο αριθμός των περιπτώσεων από την αρχή της λειτουργίας του Κέντρου έχει ως εξής:

Έτος	Κλήσεις
1976	4.086
1980	15.280
1985	23.634
1990	30.286
1995	34.214
2000	42.418
2004	41.079
2010	34.962
2011	35.826
2012	32.404
2013	31.201
2014	32.746
2015	31.018



Σχήμα 1. Αριθμός Κλήσεων στο Κέντρο Δηλητηριάσεων


Ο μικρότερος αριθμός περιπτώσεων που καταγράφηκαν από το 2007 και μετά οφείλεται α) στην απόφαση να μην καταγράφονται πλέον οι άσχετες με δηλητηρίαση ερωτήσεις του κοινού

και β) στη χρήση των μηνυμάτων από τις γραμμές του Κέντρου που είτε απαντούν απ' ευθείας, είτε κατευθύνουν καταλλήλως, σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ερωτήσεων του κοινού.

2. Γεωγραφική προέλευση (Σχ. 2)

Η προέλευση των κλήσεων από τα διάφορα διαμερίσματα της χώρας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Διαμέρισμα</u>	<u>% (επί των καταγεγραμμένων)</u>
Αττική	40,8
Λοιπή Στερεά & Εύβοια	5,8
Πελοπόννησος	9,0
Νησιά Ιονίου	2,2
Ήπειρος	2,7
Θεσσαλία	5,6
Μακεδονία	18,1
Θράκη	2,6
Νησιά Αιγαίου	6,0
Κρήτη	7,1
Κύπρος	0,1
Άλλες χώρες	0,1
Σύνολο	100,0




Σχήμα 2. Περιοχή προέλευσης

Το ποσοστό των δηλητηριάσεων είναι υψηλότερο στα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα τα μεγάλα. Κι αυτό γιατί, εκτός βέβαια από την όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση του πληθυσμού σε αυτά, οι συνθήκες εκεί ευνοούν τις δηλητηριάσεις. Τα παιδιά δεν έχουν ελεύθερους χώρους για παιχνίδι παρά μόνο τα μικρά, συνήθως, διαμερίσματα. Ακόμα η ζωή στα αστικά κέντρα είναι περισσότερο πιεστική, με γρήγορους ρυθμούς, με αποξένωση των ανθρώπων μεταξύ τους, δημιουργώντας συνθήκες άγχους, μοναξιάς και κατάθλιψης που οδηγούν σε περισσότερες απόπειρες αυτοκτονίας.

3. Ποιοι απευθύνονται στο Κέντρο (Σχ. 3)

	Αρ. περιπτώσεων	%
Νοσοκομεία	10.455	33,7
Κέντρα Υγείας	1.716	5,5
Αγροτικά Ιατρεία	40	0,1
Γιατροί	504	1,6
Φαρμακεία	78	0,3
Εργασιακός χώρος	13	0,0
Κοινό	16.652	53,7
Κοινό + Υγιεινομική Μονάδα	1.560	5,0
Σύνολο	31.018	100,0




Σχήμα 3. Ποιοί απευθύνονται στο Κέντρο

Η μεγαλύτερη συχνότητα κλήσεων από το κοινό σε σχέση με τη συχνότητα κλήσεων από τις μονάδες Υγείας, οφείλεται στο ότι ένα μεγάλο ποσοστό δηλητηριάσεων αφορά απλή έκθεση στον τοξικό παράγοντα σε χαμηλές δόσεις ή σε έκθεση σε μη τοξικούς παράγοντες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ρόλος του Κέντρου Δηλητηριάσεων είναι μετά την επακριβή λήψη ιστορικού και την εκτίμηση των συμπτωμάτων και της επικινδυνότητας της ληφθείσας ουσίας και δόσης να αποφασίσει αν το εκτεθειμένο στην τοξική ουσία άτομο έχει ένδειξη παραπομπής σε μονάδα υγείας, για παρακολούθηση και θεραπεία. Αν δεν αποφασισθεί μεταφορά του ασθενούς σε Νοσοκομείο, τότε δίνονται οδηγίες στον ασθενή ή στο περιβάλλον του για αντιμετώπιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μεταγενέστερων κλινικών σημείων αν προκύψουν. Με τη διαδικασία αυτή ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και τη λήψη σαφών οδηγιών, παραμένει σπίτι του. Όταν υπάρχει αμφιβολία για τη ληφθείσα ουσία και δόση, καλό είναι ο ασθενής να παραπέμπεται για κλινική εκτίμηση σε γιατρό.

Νοσοκομειακή φροντίδα δέχεται περίπου το 35% - 40% των περιστατικών.

4. Ηλικία (Σχ. 4)

Ηλικίες (έτη)	% (επί των καταγεγραμμένων)
< 1	3,8
1 – 5	41,6
5 – 10	6,8
10-14	2,2
14-18	2,9
18-30	8,4
30-50	18,0
50-70	10,4
> 70	5,9
Σύνολο	100,0



Σχήμα 4. Ηλικιακή Κατανομή

Όπως προκύπτει από τον πίνακα και το σχήμα 4 η ηλικία 1-5 ετών είναι η πλέον ευαίσθητη για δηλητηριάσεις. Στην ηλικία αυτή τα παιδιά χαρακτηρίζονται από μεγάλη περιέργεια και από άγνοια. Το γεγονός αυτό επιβάλλει αυξημένη προσοχή από τους μεγάλους. Πρωταρχικό ρόλο παίζει η ενημέρωση – εκπαίδευση των γονιών για τους κινδύνους δηλητηρίασης που μπορεί να συμβεί μέσα στο σπίτι. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με μαθήματα από εξειδικευμένο προσωπικό στους βρεφικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, με φυλλάδια που μπορεί να διανέμονται από τις Μονάδες Υγείας, αλλά και από τους δήμους και με εκπαιδευτικές εκπομπές από την τηλεόραση.


Από τη στιγμή που υπάρχει ενημέρωση για τον πιθανό κίνδυνο δηλητηρίασης των νηπίων μέσα στο σπίτι, πρώτο μέτρο πρόληψης είναι η σωστή φύλαξη των επικίνδυνων ουσιών. Όλα τα φάρμακα, τα εντομοκτόνα, τα φυτοφάρμακα και τα είδη οικιακής χρήσης, πρέπει αφ' ενός να έχουν πώμα ασφαλείας, αφ' ετέρου να φυλάσσονται σε κλειδωμένα ντουλάπια. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ντουλάπι που να κλειδώνει, μπορούν να φυλαχτούν π.χ. σε μία βαλίτσα που κλειδώνει.

5. Φύλο κατά ηλικίες (επί των καταγεγραμμένων)

Έτος	Άρρενες	Θήλειες	Σύνολο
< 1	466	420	886
1 – 5	5.519	4.818	10.337
5 – 10	954	714	1.668
10-14	276	285	561
14-18	206	534	740
18-30	846	1.298	2.144
30-50	1.938	2.695	4.633
50-70	1.122	1.559	2.681
> 70	624	877	1.501
Σύνολο	11.951	13.200	25.151

6. Μηνιαία κατανομή κλήσεων (Σχ. 5)

Μήνας	Αρ. περιπτώσεων	%
Ιανουάριος	2.353	7,6
Φεβρουάριος	2.272	7,3
Μάρτιος	2.628	8,5
Απρίλιος	2.687	8,7
Μάιος	2.981	9,6
Ιούνιος	2.777	9,0
Ιούλιος	2.836	9,1
Αύγουστος	2.831	9,1
Σεπτέμβριος	2.582	8,3
Οκτώβριος	2.487	8,0
Νοέμβριος	2.337	7,5
Δεκέμβριος	2.247	7,2
Σύνολο	31.018	100,0




Σχήμα 5. Μηνιαία Κατανομή

7. Αίτια δηλητηριάσεων (Σχ. 6)

Τα αίτια των δηλητηριάσεων σ' όλες τις ηλικίες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Είδος</u>	<u>% (των καταγεγραμμένων)</u>
Φάρμακα	33,6
Γεωργικά φάρμακα	7,8
Είδη οικιακής χρήσης	23,5
Καλλυντικά	5,2
Δήγματα ζώων – νυγμοί	2,1
Φυτά	1,7
Διάφορα χημικά	18,6
<u>Διάφορα άλλα</u>	<u>7,5</u>
<u>Σύνολο</u>	<u>100,0</u>




Σχήμα 6. Αίτια Δηλητηριάσεων

Τα φάρμακα ευθύνονται για μεγάλο αριθμό δηλητηριάσεων, ενώ σημαντικό ποσοστό καλύπτουν τα είδη οικιακής χρήσης.

8. Συχνότητα - αίτια δηλητηριάσεων στα παιδιά

Πα) Συχνότητα παιδικών δηλητηριάσεων.


Οι δηλητηριάσεις που αφορούν παιδιά ηλικίας 0-14 ετών καταλαμβάνουν το 54,4% του συνόλου των δηλητηριάσεων. Στη βρεφική ηλικία (0-1 έτους) η συχνότητα είναι 6,9% επί των παιδικών δηλητηριάσεων. Πιο επικίνδυνη ηλικία είναι μεταξύ 1- 5 ετών όπου συμβαίνει το 76,5% των δηλητηριάσεων της παιδικής ηλικίας. Στην ηλικία 5-10 ετών η συχνότητα είναι 12,4%, ενώ σαφής μείωση παρατηρείται στην ηλικία 10-14 ετών (4,1%).



Σχήμα Πα: Συχνότητα παιδικών δηλητηριάσεων

Πβ) Από πού προέρχονται οι κλήσεις αναλόγως της ηλικίας.


Κυρίως αυτοί που καλούν είναι οι γονείς (κοινό), οι οποίοι και λαμβάνουν τις κατάλληλες οδηγίες για παρακολούθηση στο σπίτι ή άμεση αντιμετώπιση και μεταφορά στο Νοσοκομείο αν χρειάζεται. Όταν οι ασθενείς τελικά κατευθυνθούν στο Νοσοκομείο, το περιστατικό καταγράφεται στις κλήσεις από Νοσοκομεία.



Σχήμα Πβ: Από πού προέρχονται οι κλήσεις


Πγ) Πού συνέβη η δηλητηρίαση

Οι παιδικές δηλητηριάσεις συμβαίνουν κυρίως στο σπίτι.



Σχήμα Πγ: Πού συνέβη η δηλητηρίαση

Πδ). Αίτια δηλητηριάσεων στα παιδιά κατά ηλικία



Σχήμα Πδ: Αίτια δηλητηριάσεων κατά είδος και ηλικία

Εκτός από τα βρέφη (0-1 ετών) όπου υπερéχουν τα διάφορα χημικά, σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες υπερτερούν σαφώς οι δηλητηριάσεις από φάρμακα. Αθροιστικά όμως, τα διάφορα χημικά προϊόντα που βρίσκονται στο σπίτι (είδη οικιακής χρήσης + διάφορες χημικές ουσίες + καλλυντικά κ.ά.) υπερéχουν κυρίως στις μικρότερες ηλικίες. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα σωστής φύλαξης αυτών των προϊόντων.

9. Δηλητηριάσεις από φάρμακα

Φάρμακα	Αρ.περιπτώσεων
Ηρεμιστικά – Υπνωτικά	1.035
Ψυχοφάρμακα-Νευροληπτικά άλλα	540
Παρακεταμόλη	857
Ασπιρίνη	136
Μεφεναμικό οξύ - Ponstan	152
Αντιφλεγμονώδη άλλα.....	583
Αλοιφές – κρέμες φαρμακευτικές	592
Αντιβιοτικά.....	585
Καρδιαγγειακά.....	421
Αντισηπτικά.....	360
Ορμόνες.....	346
Αντιϊσταμινικά-Αντιαλλεργικά	326
Βρογχοδιασταλτικά	274
Αντιεπιληπτικά	201
Αντιβηχικά – Βλεννορρημιστικά.....	171
Αποσυμφορητικά	133
Γαστροπροστατευτικά.....	128
Σίδηρος	121
Ναρκωτικά –Έκσταση – Αμφεταμίνες	79
Διάφορα	1.286
Σύνολο	8.326

Τα ηρεμιστικά - αγχολυτικά (στα οποία κυρίως περιλαμβάνονται οι βενζοδιαζεπίνες) και τα υπόλοιπα ψυχοφάρμακα κατέχουν την πρώτη θέση στις δηλητηριάσεις από φάρμακα. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται μεγάλη χρήση τους και βρίσκονται σε πολλά σπίτια, παρά το ότι η προμήθειά τους γίνεται με ειδική συνταγή. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η χρήση της παρακεταμόλης και του μεφαιναμικού οξέος με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι περιπτώσεις δηλητηριάσεων με τα δύο αυτά παυσίπινα αντιπυρετικά. Η συχνότητα των ναρκωτικών και των αναλόγων φαρμάκων φαίνεται μικρότερη απ' ό,τι πραγματικά είναι, καθώς πολλές περιπτώσεις δεν αναφέρονται στο Κέντρο Δηλητηριάσεων και επομένως δεν καταγράφονται (συνήθως μας καλούν μόνο από Νοσοκομεία για σοβαρές περιπτώσεις).

10. Δηλητηριάσεις από είδη οικιακής χρήσης

Οι σημαντικότερες κατηγορίες ειδών οικιακής χρήσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Είδος	Αρ.περιπτώσεων
Απορρυπαντικά.....	1.525
Καθαριστικά	1.184
Λευκαντικά (κατάποση).....	1.074
Λευκαντικά + Οξέα (εισπνοή).....	249
Υδράργυρος θερμομέτρου	680
Πετρελαιοειδή.....	460
Μπαταρίες.....	193
Κόλλες.....	163
Αποφρακτικά νεροχυτών.....	84
Αποσμητικά χώρου	76
Ναφθαλίνη	33
Φωτιστικά έλαια – lamp oil	22
Διάφορα	83
Σύνολο	5.826

Από τον πίνακα φαίνεται ότι τα απορρυπαντικά, καθαριστικά και λευκαντικά καλύπτουν το 69% των δηλητηριάσεων με είδη οικιακής χρήσης.

Πρέπει να επισημανθεί το συχνό φαινόμενο της ανάμιξης χλωρίνης με οξέα στους χώρους του μπάνιου, οπότε εκλύεται χλώριο, που εισπνεόμενο προκαλεί σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

11. Δηλητηριάσεις από καλλυντικά

Οι σπουδαιότερες κατηγορίες καλλυντικών που προκαλούν δηλητηριάσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Είδος	Αρ. περιπτώσεων
Αφρόλουτρα - Σαμπουάν – Σαπούνια.....	587
Αλοιφές - Κρέμες καλλυντικές	143
Αρώματα - Αποσμητικά – Κολώνιες.....	142
Αντιηλιακά – καλλυντικά λάδια	109
Κραγιόν χειλέων.....	59
Οδοντόπαστες	57
Μανόν	53
Βαφές - Λάκ – Μαλακτικά μαλλιών.....	38
Πούδρες.....	37
<u>Διάφορα καλλυντικά</u>	<u>55</u>
<u>Σύνολο</u>	<u>1.280</u>

Συμβαίνουν κυρίως στα παιδιά. Τα καλλυντικά γενικά δεν είναι τόσο τοξικά εκτός από ορισμένες βαφές μαλλιών. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δηλητηριάσεις από διάφορα αρώματα είναι συχνές στα παιδιά, λόγω της υποεκτίμησης του κινδύνου και της μη ασφαλούς φύλαξης τους από τους γονείς και μπορεί να είναι σοβαρές, λόγω του οινοπνεύματος που περιέχουν.

12. Δηλητηριάσεις από γεωργικά φάρμακα

Οι δηλητηριάσεις με γεωργικά φάρμακα έγιναν με τις παρακάτω κατηγορίες:

Είδος	Αρ.Περιπτώσεων
Οργανοφωσφορικά	110
Καρβαμιδικά.....	4
Πυρεθρίνες.....	245
Εντομοκτόνα άλλα.....	457
Ποντικοφάρμακα	237
Ζιζανιοκτόνα άλλα (εκτός παρακουάτ, Diquat και Glyphosate)	141
Παρακουάτ	2
Diquat.....	4
Glyphosate.....	7
Λιπάσματα	90
<u>Διάφορα</u>	<u>646</u>
<u>Σύνολο</u>	<u>1.943</u>

Οι δηλητηριάσεις με γεωργικά φάρμακα δεν είναι πάρα πολλές, αλλά είναι οι περισσότερες επικίνδυνες. Μερικά γεωργικά φάρμακα είναι πολύ τοξικά και αρκούν πολύ μικρές ποσότητες για να προκαλέσουν βαριά ή θανατηφόρα δηλητηρίαση.

Αρκετές από τις δηλητηριάσεις με γεωργικά φάρμακα γίνονται διότι οι αγρότες δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας, είτε από άγνοια, είτε κυρίως από υποτίμηση των κινδύνων.

13. Δηλητηριάσεις από φυτά

Δηλητηριάσεις από φυτά συμβαίνουν κάθε χρόνο, αλλά σε περιορισμένο αριθμό. Παρ' όλα αυτά μερικές φορές οι δηλητηριάσεις είναι βαριές και δυνητικά θανατηφόρες.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα φυτά που προκαλούν τις σημαντικότερες ή περισσότερες δηλητηριάσεις.

Φυτά	Αρ. περιπτώσεων
Μανιτάρια Phalloides	54
Μανιτάρια Muscaria	196
Πικροδάφνη.....	11
Πικραγγουριά	7
Δρακοντριά ή Άρον το στικτόν.....	3
Κουκιά.....	2
Μπελαντόνα.....	1
Μανδραγόρας	1
Πλατύφυλλα	0
Σπάρτο (614)	0
Διάφορα	134
Σύνολο	409

Στις δηλητηριάσεις από φυτά επικρατούν τα αυτοφυή (άγρια) μανιτάρια. Δυστυχώς κάθε χρόνο συμβαίνουν βαριές και δυνητικά θανατηφόρες δηλητηριάσεις από μανιτάρια. Η γρήγορη αντιμετώπιση με τα κατάλληλα αντίδοτα και η σημαντική υποστηρικτική θεραπεία, που προσφέρεται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Τεχνητού Νεφρού, έχουν ελαττώσει κατά πολύ τη θνητότητα και την κατάληξη σε ηπατική ανεπάρκεια.

14. Δήγματα

Νυγμοί και δήγματα από έντομα, ερπετά και άλλα ζώα σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ζώα	Αρ. περιπτώσεων
Φίδια	195
Σκορπιοί ξηράς	70
Σαρανταποδαρούσα	38
Αράχνες	37
Δράκαινες.....	33
Σμέρνα – σαλάχι	20
Σφήκες, Μέλισσες	19
Έντομα άλλα.....	8
Σκυλιά	9
Σκορπιοί θαλάσσης.....	4
Τσούχτρες.....	3
Διάφορα δήγματα	75
Σύνολο	511

Τα δηλητηριώδη φίδια στην Ελλάδα (και στην Ευρώπη) είναι 4-5 είδη έχιδνας (οχιάς). Τα δαγκώματα από δηλητηριώδη φίδια είναι επικίνδυνα και μπορεί να αποβούν θανατηφόρα. Είναι προφανές ότι οι νυγμοί από σφήκες, μέλισσες και άλλα έντομα υποαντιπροσωπεύονται στον παραπάνω πίνακα, αφ' ενός μόν γιατί θεωρούνται και συνήθως είναι αθώοτεροι από δήγματα π.χ. φιδιών και πολλοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν στο γιατρό, αφ' ετέρου δε πολλοί γιατροί δεν αναφέρουν τέτοιες περιπτώσεις στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

15. Δηλητηριάσεις με διάφορες χημικές ουσίες


Είδος	Αρ. Περιπτώσεων
Νικοτίνη.....	1.716
Ηλεκτρονικό τσιγάρο.....	46
Αιθυλική αλκοόλη.....	364
Silica gel.....	305
Οξέα.....	236
Σχολικά είδη.....	225
Χημικά αέρια άλλα, (εκτός CO).....	204
Μελάνι.....	203
Νέφτι.....	182
Ακετόνη.....	120
Αιθέρια έλαια.....	90
Διαλυτικά άλλα.....	86
Μπαταρίας υγρά.....	70
Χρώματα διάφορα.....	68
Καρποί που περιέχουν κυανιούχα.....	50
Πυροσβεστήρες.....	45
Υγραέριο.....	39
Γλυκόλες.....	38
Μονοξειδίο του άνθρακα.....	28
Φωσφόρος.....	25
Διορθωτικό.....	18
Αλκάλια.....	2
Διάφορα	456
Σύνολο	4.616

Στον πίνακα αυτό φαίνονται διάφορες ουσίες που χρησιμοποιούνται κυρίως σε εργασιακούς - επαγγελματικούς χώρους, αλλά και στο σπίτι.

Η δηλητηρίαση με νικοτίνη σε βρέφη και νήπια από μάσηση καπνού είναι από τις συχνότερες δηλητηριάσεις της παιδικής ηλικίας. Επίσης η δηλητηρίαση με αιθυλική αλκοόλη (οξεία μέθη), που προκαλείται από οινοπνευματώδη ποτά, ιδιαίτερα σε παιδιά και γενικά σε νεαρά άτομα καλύπτει μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. Πολλές περιπτώσεις δεν αναφέρονται στο Κ.Δ., είτε γιατί δεν προσκομίζονται στα Νοσοκομεία, είτε γιατί από τα Νοσοκομεία καλείται το Κ.Δ. μόνο όταν πρόκειται για παιδί ή για ασθενή σε κωματώδη κατάσταση.

16. Είδος δηλητηριάσεων (Σχ. 7)

Είδος	Αρ. περιπτώσεων	%
Ατύχημα.....	25.546	82,3
Απόπειρα.....	4.503	14,5
Λάθος χρήση φαρμάκων.....	132	0,4
Κατάχρηση ουσιών.....	378	1,2
Επαγγελματική έκθεση.....	454	1,5
Άλλο ή άσχετο.....	5	0,0
Σύνολο	31.018	100,0



Σχήμα 7. Είδος Δηλητηριάσεων

Οι απόπειρες αυτοκτονίας αφορούν ένα σημαντικό ποσοστό (14,5%) από το σύνολο των δηλητηριάσεων που καταγράφηκαν κατά το 2015 από το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Τα άτομα που κάνουν συνηθέστερα απόπειρα αυτοκτονίας είναι: έφηβοι, νέοι ενήλικες και άτομα της τρίτης ηλικίας.


Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες ουσίες είναι: Τα ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και διάφορα νευροληπτικά και ψυχοτρόπα φάρμακα, τα παυσίπονα (κυρίως παρακεταμόλη και ασπιρίνη) και αντιφλεγμονώδη, τα αντιβιοτικά, διάφορες χημικές ουσίες (κυρίως χλωρίνη) και γεωργικά φάρμακα.

Είναι εμφανές ότι μέτρα πρόληψης είναι απαραίτητα και αποτελούν υποχρέωση α) των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για αναγνώριση – επιτήρηση του προβλήματος και β) των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για εκπαίδευση – ενημέρωση των εφήβων, αλλά και του γενικού πληθυσμού για την αποφυγή πολυφαρμακίας, τον έλεγχο της αλόγιστης χρήσης αναλγητικών, ηρεμιστικών και την όσο το δυνατό μικρότερη διαθεσιμότητά τους στα σπίτια.

Σχετικά με τις επαγγελματικές δηλητηριάσεις πρέπει να τονίσουμε ότι προφανώς ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος. Αρκετές από τις αναφερόμενες συμβαίνουν κατά τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

17. Οδός λήψης ή επίδρασης ουσιών (Σχ. 8)

Οδός λήψης	Αρ.περιπτώσεων	% (επί των καταγεγραμμένων)
Στόμα	23.223	83,0
Μάτια	460	1,6
Εισπνοή	1.872	6,7
Δέρμα	921	3,3
Παρεντερικώς	1	0,0
Άλλοι τρόποι ή συνδυασμοί	1.492	5,3



Σχήμα 8. Οδός λήψης ή επίδρασης ουσιών

Όπως ήδη έχει αναφερθεί οι δηλητηριάσεις συμβαίνουν κυρίως στο σπίτι. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι τα στοιχεία αφορούν τις δηλητηριάσεις που καταγράφονται στο Κέντρο Δηλητηριάσεων ύστερα από κλήση από τις μονάδες υγείας ή το κοινό. Οι επαγγελματικές δηλητηριάσεις που καταγράφονται, δεν αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό αριθμό των περιστατικών γιατί αφ' ενός δεν καταγράφονται οι χρόνιες επαγγελματικές εκθέσεις με μακροπρόθεσμη βλαπτική επίδραση, ούτε αφ' ετέρου οι πολύ ελαφρές που υποεκτιμούνται και αντιμετωπίζονται εμπειρικά στο χώρο εργασίας.

Οι 20 κυριότερες αιτίες δηλητηριάσεων:

Αριθμ. περιπτώσεων

Νικοτίνη (Μάσηση καπνού + Ηλεκτρονικό τσιγάρο)	1.762
Ηρεμιστικά – υπνωτικά φάρμακα	1.035
Ψυχοφάρμακα – νευροληπτικά άλλα	741
Παρακεταμόλη	857
Αντιφλεγμονώδη – αναλγητικά – αντιπυρετικά άλλα	871
Απορρυπαντικά και καθαριστικά γενικά	2.709
Χλωρίνη – Λευκαντικά	1.323
Αιθυλική αλκοόλη και διάφορες χημικές ουσίες γενικά	2.854
Γεωργικά φάρμακα γενικά	1.943
Καλλυντικά γενικά	1.280
Υδράργυρος θερμομέτρου	680
Αλοιφές – κρέμες φαρμακευτικές	592
Αντιβιοτικά – Χημειοθεραπευτικά	585
Δήγματα – Νυγμοί	511
Πετρελαιοειδή	460
Καρδιαγγειακά φάρμακα	421
Φυτά	409
Αντισηπτικά φάρμακα	360
Ορμόνες	346
Αντιϊσταμινικά - αντιαλλεργικά	326